

CHOROBA PARKINSONA

Jest to choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego spowodowana zaburzeniami w produkcji dopaminy – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego m.in. za koordynację ruchów i napięcie mięśni. Występuje na ogół po sześćdziesiątce.

Objawy: drżenie rąk, nóg, żuchwy i twarzy; sztywność kończyn i tułowia, spowolnienie ruchów, trudności w utrzymaniu równowagi, chodzeniu, mówieniu i wykonywaniu prostych czynności. Niekiedy objawom tym towarzyszą: depresja, trudności w zasypianiu, wybudzanie się ze snu, trudności z połykaniem pokarmów, utrata masy ciała.

Przyczyny: zniszczenie komórek nerwowych wydzielających dopaminę; mechanizm tego procesu nie jest do końca wyjaśniony.

Terapia:

Kuracja: czas trwania minimum 40 dni

I etap

Chitosan (2x dziennie po 1 kapsułce),

Kordiceps (2x dziennie po 2 kapsułki),

Biowapń do poprawy pracy mózgu (3x dziennie po 1–2 kapsułki).

Gdy chory ma ciśnienie stabilne, zamiast **Kordicepsu** możemy włączyć do kuracji **Ikan** (2x dziennie po 1 kapsułce).

Uwaga!

Między zażyciem **Chitosanu** a innych preparatów musi wystąpić dwugodzinna przerwa.

II etap

Po zakończeniu kuracji z Chitosanem lub Ikanem podajemy **Biocynk**, który polepsza przesyłanie sygnałów nerwowych (2x dziennie po 2–3 kapsułki) oraz dla poprawy krążenia mózgowego **Veikan** (1 kapsułka po południu). Można też podawać **Cholikan** (2x dziennie po 1 kapsułce) oraz **Tran z węgorka** (1–2x dziennie po 1–3 kapsułki). Po 70. roku życia dawki preparatów, z wyjątkiem **Biowapnia**, należy zmniejszyć o połowę. Ponieważ jest to choroba przewlekła, przez czas trwania kuracji podajemy **Biowapń do poprawy pracy mózgu** (3x dziennie po 1–2 kapsułki).