

ZAPALENIE PRZYDATKÓW

Przydatkami nazywane są jajniki i jajowody. Narządy te położone są blisko siebie, a zatem stany zapalne na ogół obejmują i jajniki, i jajowody. Na zapalenie przydatków cierpią głównie młode, aktywne seksualnie kobiety. Ryzyko wystąpienia schorzenia staje się większe po miesiączce, poronieniu, przedwczesnym porodzie, zabiegach ginekologicznych. Wzrasta nawet kilkakrotnie, gdy kobiety mają kilku partnerów.

Objawy: nagłe skurczowe bóle brzucha, gorączka lub stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie, odruchy wymiotne związane z podrażnieniem otrzewnej, obfite miesiączki, plamienia międzymiesiączkowe.

Przyczyny: Zakażenie drogą płciową (90 proc. przypadków), niekiedy przenoszone jest przez krew z innych ognisk zapalnych (zatoki, zęby, migdałki, jama brzuszna).

Terapia: W stanach ostrych podaje się **Kordiceps** przez 30 dni (2x dziennie po 3 kapsułki), następnie przez 6 miesięcy – 2x dziennie po 1 tabletkę. W profilaktyce wskazana jest **Podwójna celuloza** (3x dziennie po 1 tabletkę – pół godziny przed jedzeniem). Pamiętajmy, że Podwójnej celulozy nie mogą stosować kobiety w ciąży.